



**Título del estudio:** **Wirksamkeit und Verträglichkeit einer topischen Zubereitung mit 10% Urea (Eucerin® Salbe 10% Urea) bei Neurodermitis**

**Autores:** Wilhelm, K.P., Schölermann, A., Bohnsack, K., Wilhelm, D., Rippke, F.  
**Fuente:** Akt. Dermatologie 24, 26-30 (1998).

**Centros de estudio:** proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, Schenefeld, Alemania.

**Objetivo:** Evidencia documental de la eficacia y la tolerancia cutánea de **Eucerin® Urea** al 10% Pomada en pacientes con dermatitis atópica.

**Producto en estudio:** **Eucerin® Urea Pomada 10%**

**Métodos:**

- Estudio a doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, basado en una comparación entre las dos mitades del cuerpo.

**Participantes:**

- 80 pacientes

**Diagnósticos:**

- Dermatitis atópica en fase subcrónica.

**Aplicación:**

- 4 semanas, 2 veces al día.

**Zona en estudio:**

- Antebrazos.

**Resultados:**

- La eficacia fue evaluada como "buena" o "muy buena" por un 61% de los pacientes (placebo: 48%).
- En comparación con el placebo, la tolerancia local de **Eucerin® Urea** al 10% Pomada fue evaluada como significativamente superior.
- Se registró una diferencia significativa entre el éxito terapéutico logrado con urea y el resultado obtenido con placebo, a favor del preparado (**Eucerin® Urea** al 10%) con urea.

**Conclusiones:** **Eucerin® Urea al 10% Pomada es muy adecuado para el tratamiento de la dermatitis atópica subcrónica. La mayoría de los pacientes evaluaron la eficacia y la tolerancia local como "buenas" o "muy buenas".**