



Título del estudio:	Efficacy of Urea Therapy in Children with Ichthyosis
Autores:	Küster, W., Bohnsack, Rippke, F., Upmeyer, H.-J., Groll, S., Traupe, H.
Fuente:	Dermatology 196, 217-222 (1998).
Centros de estudio:	Multicéntrico.

Objetivo:	Evidencia documental de la eficacia y la tolerancia cutánea de Eucerin® Urea Loción en niños con ictiosis.
Producto en estudio:	Eucerin® Urea Loción 10%
Métodos:	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio a doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, basado en una comparación entre las dos mitades del cuerpo.
Participantes:	<ul style="list-style-type: none"> • 60 pacientes (de edades comprendidas entre 1 y 16 años).
Diagnósticos:	<ul style="list-style-type: none"> • Ictiosis.
Aplicación:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 semanas, 2 veces al día.
Zona en estudio:	<ul style="list-style-type: none"> • Brazos o piernas; en todos los casos, una de las partes del cuerpo fue tratada con la loción formulada con urea y la otra, con una loción sin urea (vehículo). En cada uno de los lados, una zona sin tratar sirvió de control.

Resultados:	<ul style="list-style-type: none"> • La eficacia de Eucerin® Urea al 10% Loción fue evaluada por los médicos como "buena" o "muy buena" en un 79% de los pacientes. • La mejoría de los síntomas fue significativamente superior en las zonas tratadas con Eucerin® Urea al 10% Loción que en las zonas en que se aplicó el vehículo sin urea. • La tolerancia cutánea fue evaluada por el médico investigador y los pacientes como "buena" o "muy buena" en un 98% de los casos. • Las propiedades cosméticas fueron evaluadas como "buenas" y "muy buenas" en más del 80% de los casos.
--------------------	---

Conclusiones: **Eucerin® Ureal al 10% Loción es muy adecuado para tratar extensas zonas cutáneas en niños afectados de diversas formas de ictiosis.**